

## Roundup Gel

**Taimekaitsevahend.**

**Herbitsiid.**

**Toimeaine:** glüfosaat 7.2 g/l (0,71% w/w)

**Preparaadi vorm:** kasutusvalmis geel

**Partii nr ja valmistamise kuupäev:** vaata pakendilt

**Eesti reg. nr:** 0554/08.05.15

Pakend: 15 ml, 50 ml kuni 500 ml

**Hädaabi telefon:** 112. **Mürgistusteabekeskuse lühinumber:** 16662.

**Loa valdaja:** Evergreen Garden Care Poland Sp. Z o.o., ul. Ostrobramska, 101A, PL-04-041 Warszawa, Poola

**Valmistaja ja pakkija:** Evergreen Garden Care Belgium BVBA, Voshol 8, B-9160 Lokeren, Belgia

**P102:** Hoida lastele kättesaamatus kohas.

**P234:** Hoida üksnes originaalpakendis.

**EUH401:** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendit.

**EUH208:** Sisaldab 5-kloro-2-metüül-4-isotiasoliin-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni.

**SP1:** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede dreenažide).

**Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.**

**Kasutusala:** üldhävitava toimega herbitsiid lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks väikeaegades: viljapuude ja marjapõõsaste võraalustel pindadel, teeradadel ja juurdepääsuteedel, mitteharitaval maal ning umbrohtunud peenramaal pärast saagikoristust.

**Kasutuspiirang:** toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses.

**Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu.**

**Roundup GEL`i toimeviis:** Roundup GEL tapab suurema osa umbrohtudest juba esimesel korral, kui kanda toodet taimetele vastavalt juhistele. Esimesi märke võib näha 5–10 päeva pärast sõltuvalt umbrohu tüübist ja ilmastikutingimustest. Roundup GEL mõjub aeglasemalt, kui ilm on jahe ja

kuiv, samuti suuremate mitmeaastaste taimede puhul. Juured surevad 7–28 päevaga, taas sõltuvalt umbrohu tüübist ja ilmastikutingimustest.

**Kasutamine:** Kandke peale siis, kui taimed on rohelised ja kasvavad aktiivselt ning kui lehepinda on juba piisavalt. Mitmeaastaste taimede tõrjumiseks kandke toodet parimate tulemuste saamiseks lehtedele enne õitsemise algust. Jätke töödeldud umbrohud enne kaevamist ja kobestamist 7 päevaks seisma, et preparaat jõuaks juurteni. Vajadusel korrake töötlemist, kui ilmuvad uued kasvud.

## KASUTUSJUHEND

### AVAMINE:

1. Pigistage 2 sinist korgikõrva pudeli külgedel ning tõstke korki.
2. Eemaldage fooliumkate.
3. Suruge/vajutage sinist nuppu, et geel välja tuleks.
4. Enne esmakordset kasutamist valmistage GEL`i pudel ette, vajutades sinist nuppu umbes 20 korda, kuni GEL ilmub pudeli ülaossa.

### KASUTAMINE:

5. Puudutage lehepinda või libistage üle selle. Kogu lehepinda ei ole vaja katta.
6. Kulunorm: 10-20 ml/m<sup>2</sup>

Kandke minimaalselt 30% umbrohu lehtedele.

- 1 vajutus üheaastastele ja lihtsalt eemaldatavatele taimedele, mille lehepind on umbes 20 cm × 15 cm) (300 cm<sup>2</sup>)
- 2 vajutust mitmeaastastele ja raskesti eemaldatavatele taimedele, mille lehepind on umbes 20 cm × 15 cm) (300 cm<sup>2</sup>)
- Kasutuskordade arv: vajadusel kuni 3 korda intervalliga 28 päeva

### PÄRAST KASUTAMIST:

Eemaldage geel siniselt aplikaatorilt, pühkides seda vastu umbrohu lehte, seejärel pange sinine kork tagasi ning joondage sinised korgikõrvad.



**Ettevaatusabinõud:** Hoida lastele kättesaamatus kohas. Hoida üksnes originaalpakendis. Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks tuleb järgida kasutusjuhendit.

**Taara kahjutustamine:** Tühjaks saanud taimekaitsevahendi pakendit loputada töölahuse valmistamise ajal puhta veega vähemalt kolm korda, loputusvesi valada taimekaitseseadme paaki või kasutada selleks vastavat tankimisseadme loputusmehhanismi. Taara korduskasutamine on keelatud. Tühjad pakendid koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

**Esmaabi:**

**Kokkupuude silmaga**

Loputage kohe rohke veega. Kui võimalik, eemaldage kontaktläätsed (kui neid kantakse).

**Kokkupuude nahaga**

Eemaldage saastunud riietus, käekell, ehted. Peske kahjustatud nahka rohke veega. Enne uuesti kasutamist peske riided ja puhastage jalanõud.

**Sissehingamise korral**

Viia värske õhu kätte.

**Allaneelamise korral**

Loputage suud põhjalikult veega. Andke kohe vett juua. Ärge kunagi andke teadvusetule inimesele midagi suu kaudu. MITTE kutsuda esile oksendamist, välja arvatud juhul, kui seda palub teha meditsiiniline personal. Sümptomite tekkimisel pöörduge arsti poole.

**Keskkonnaohtlikkus:** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

**PIIRANGUD:**

Vältige kontakti kultuurtaimedega. Vältimaks edasikandumist muruplatsidele ja muudele vajalikele taimedele, ärge kõndige töödeldud aladel, kuni toode on kuivanud. Tühja pudelit ei tohi taaskasutada. Kui 6 tundi pärast toote pealekandmist sajab vihma, väheneb toote mõju ning vajalik võib olla kordustöötlus. Hoidke lapsed ja koduloomad töödeldud aladest eemal kuni Roundup Gel'i kuivamiseni.

**Taara kahjustamine:** Tühjendage anum täielikult ning kõrvaldage ohutult kasutusest. Taara korduvkasutamine on keelatud.

**Hoiutingimused:** Hoida temperatuuril mitte alla -15° C ja mitte üle +40° C kuivas ja otsese päikese eest kaitstult.

**Tähelepanu!**

Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse. Kasutusjuhend ning soovitused on välja töötatud ametlike katsetuste põhjal, samuti praktiliste kogemuste najal. Firma

ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud muudatused kasutusmeetodites, taimede resistentsuse kasv jms., mida preparaadi registreerimisel ja kaubastamisel polnud võimalik ette näha.